

I-RECOVERSM

POST-VACCINE TREATMENT

Obvladovanje sindroma po cepljenju

Sindrom po cepljenju je kompleksno bolezensko stanje. Zdravljenje mora biti prilagojeno posamezniku, glede na njegove simptome in bolezenske znake. Bolniki se različno odzivajo na iste ukrepe, v vsakem primeru pa je bistvenega pomena, da zdravljenje začnemo čim prej in s tem dosežemo boljše rezultate

UVOD

Ta dokument je namenjen zdravstvenim delavcem, ki se v svoji praksi srečujejo z bolniki, ki so po cepljenju proti COVID-19 razvili različne simptome. Nekatera zdravila, navedena v tem protokolu za zdravljenje po cepljenju, lahko jemljejo bolniki sami, vseeno pa priporočamo, da se, pred začetkom jemanja katerih koli zdravil, o tem posvetujejo z zaupanja vrednim zdravnikom (*kontakt*)

Obstaja tudi bolj podroben in obširen priročnik za [Obvladovanje sindroma po cepljenju](#), v katerem so navedena pomembna opozorila in kontraindikacije, ki jih je potrebno pozorno preučiti skupaj s kvalificirano strokovno osebo.

PRISTOP K ZDRAVLJENJU

Pomembno je poudariti, da ni objavljenih uradnih poročil in protokolov za zdravljenje poškodovanih bolnikov po cepljenju in, da naš pristop zdravljenja temelji na načelih patogenetskih mehanizmov, farmakologije, na podlagi kliničnih ugotovitev in povratnih informacij samih bolnikov s poškodbami po cepljenju. V sodelovanju z zaupanja vrednimi zdravniki neprestano posodabljammo naš pristop z novimi podatki in ugotovitvami.

Bolniki z bolezenskim sindromom po cepljenju ne smejo prejeti nobenega nadaljnega odmerka cepiv proti COVID-19. Prav tako se morajo cepljenju proti kovidu izogibati bolniki s sindromom dolgotrajnega koviida.

Bolniki s sindromom po cepljenju bi morali narediti vse, kar je v njihovi moči, da ne zbolijo za COVID-19. To lahko vključuje preventivo (glej preventivni protokol [I-PREVENT](#)) ali, v primeru, da okužbe ali suma na okužbo z virusom, protokol zgodnjega zdravljenja (glejte protokol [I-CARE](#)). Zelo verjetno bo COVID-19 poslabšal simptomatiko poškodbe po cepljenju.

Ko pri bolniku pride do izboljšanja, se lahko različni ukrepi zmanjšujejo ali prenehajo naenkrat. V nadaljevanju se svetuje manj intenziven pristop za ohranjanje stanja.

Osrednji problem sindroma po cepljenju je dolgotrajno neravnovesje imunskega sistema. Najpomembnejši cilj zdravljenja je podpreti telo pri obnovi imunskega sistema – z drugimi besedami, pri samozdravljenju.

Strategija, ki jo priporočamo, vključuje dva osnovna pristopa:

- s pospeševanjem procesa avtofagije pomagamo celicam, da se lažje znebijo beljakovinskih bodic
- uporabljamo ukrepe, ki omejijo toksičnost/patogenost beljakovinske bodice

Priporočamo uporabo imunomodulatornih zdravilnih učinkovin in ukrepov za uravnavanje delovanja imunskega sistema in ne zdravil za zaviranje imunskega sistema, ki lahko poslabšajo stanje.

O tem protokolu

Navedeni podatki ne nadomeščajo diagnoze, zdravljenja ali nasveta kvalificiranega zdravnika.

Predstavljeni dejstva so informativne narave – ne predstavljajo zdravniškega nasveta.

O protokolu zdravljenja naj se bolnik posvetuje z zaupanja vrednim zdravnikom.

V nobenem primeru ne prenehajte jemati in ne menjajte zdravil brez posvetovanja z vašim zdravnikom.

Glejte našo [Izjavo o omejitvi odgovornosti](#)

Podpri FLCCC

Združenje FLCCC je neprofitno združenje.

Financiramo se v celoti s pomočjo prostovoljnih donacij.

Z donacijo boste neposredno podprli raziskave, izobraževanje, prevode, zagovorništvo in širjenje informacij v javnosti, ki jih izvaja Združenje FLCCC.

Več na strani flccc.net/donate

Spremljaj nas na



→ [nadaljaj na strani 2](#)

Čeprav smo pripravili spodnji seznam priporočenih zdravil, vam močno priporočamo, da, pred začetkom jemanja katerih koli navedenih zdravil, bolniki in zdravniki pozorno preberejo podrobnejši protokol - "Obvladovanje sindroma po cepljenju" - kjer so navedeni podatki o odmerkih, varnostnih opozorilih, kontraindikacijah in drugi pomembni podatki.

PRVA LINIJA ZDRAVLJENJA

(vrstni red po pomembnosti; ne za specifične simptome)

- Prekinitveno vsakodnevno ali občasno dnevno postenje
- Ivermektin
- Zmerna telesna aktivnost
- Nizki odmerki naltreksona
- Natokinaza
- Aspirin
- Melatonin
- Magnezij
- Metilensko modrilo
- Sončna svetloba in fotobiomodulacija Resveratrol
- Probiotiki / prebiotiki

DRUGA LINIJA ZDRAVLJENJA

(Vrstni red po pomembnosti)

- Vitamin D (z vitaminom K2)
- N-acetilcistein
- Cardio Miracle™ in prehr. Dop. L-arginin/L-citrulin
- Omega-3 maščobne kisline
- Sildenafil z ali brez L-arginina- L-citulina
- Črna kumina
- Vitamin C
- Spermidin
- Neinvayivna možganska stimulacija
Intravenozni vitamin C
- Sprememba življenjskih navad, sprostitvena terapija, čuječnost in psihološka podpora



Opozorilo glede anestezije in kirurških posegov:

Bolniki morajo obvestiti anesteziologa, če jemljejo naslednja zdravila in/ali prehranska dopolnila, saj lahko ob prejemu opioidov povečajo tveganje za serotoninški sindrom:

- Metilensko modrilo
- Kurkumin
- Črna kumina
- Selektivni zaviralci privzema serotonina

TRETJA LINIJA ZDRAVLJENJA

- Hiperbarična kisikova terapija
- Vibracijska stimulacija nizke amplitude
- "Mitohondrijska energ. optimizacija"
- Hidroksiklorokin
- Nizki odmerki kortikosteroidov

O Ivermektinu

Ivermektin je znano zdravilo, ki se več kot štirideset let uporablja v celem svetu, v Sloveniji pa nima rednega dovoljenja za promet. Slovenski infektologi so Lekarniški zbornici Slovenije odsvetovali izdajo zdravila z učinkovino ivermektin na recept zdravnika za zdravljenje koviida. Gre za eno najbolj varnih zdravil, ki je na seznamu osnovnih zdravil pri SZO in je bilo predpisano več kot 3.7 milijardam bolnikov in prejelo Nobelovo nagrado za globalni in zgodovinski doprinos k izkoreninjenju endemskih parazitskih okužb v različnih delih sveta.

Pregled [vseh znanstvenih dokazov o učinkovitosti ivermektina pri zdravljenju COVID-19](#)

Zelo verjetno ivermektin in prekinitveni post sinergično delujeta pri čiščenju beljakovinskih bodic iz telesa.

Videti je, da lahko bolnike s poškodbami po cepljenju, razdelimo v dve kategoriji: i) odzivni na ivermektin in ii) neodzivni na ivermektin. Slednje je težje zdraviti in potrebujejo bolj agresivno terapijo.

Pri bolnikih, odzivnih na ivermektin, je velikokrat potrebno dalj časa dnevno jemati ivermektin in na ta način podpreti njihovo zdravljenje. Mnogim se vrnejo simptomi v nekaj dneh po prenehanju jemanja ivermektina.

Najboljši način za jemanje ivermektina je ob ali takoj po obroku, zaradi boljše absorpcije